

Tüdőgyógyintézet Törökbálint Csecsemő- és Gyermekepulmonológia, Bronchológia

**Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat I.
Hörgőtükrözés (bronchosopia)****Kedves Szülő!**

Írásos összefoglalónk és egy beszélgetés során tájékoztatjuk Önt a hörgőtükrözéses vizsgálat módjáról, jelentőségéről és lehetséges veszélyeiről.

A vizsgálat menete:

Hátrahajtott fejtartás mellett a vizsgáló eszközt a szájon, majd gégen át a légcsőbe és hörgőkbe vezetjük. A légutakat belülről megtekintve felismerhetők azok látható elváltozásai, melyek más vizsgáló módszerrel nem diagnosztizálhatók. A hörgőtükrözés során a légúti váladékot leszívjuk, vizsgálatra küldjük. A hörgőkben lévő félrenyelt idegentest az eszköz segítségével eltávolítható.

HÖRGŐTÜKRÖZÉS SORÁN ELVÉGEZHETŐ KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLÓ ELJÁRÁSOK

- **Hörgőtöltés (bronchographia)**
A vizsgálni kívánt hörgőágba az eszközön keresztül néhány milliméter sugárfogó kontrasztanyagot töltünk, mely a hörgők falát röntgenfelvételen kirajzolja, így a vizsgálat során nem belátható kis hörgők kóros eltérései felismerhetők, ezt követően a kontrasztanyagot leszívjuk. A nem leszívható maradék részben felszívódik, részben köhögéssel a légutakból eltávozik.
- **Hörgőmosás (lavage)**
A vizsgálni kívánt hörgőágba az eszközön keresztül néhány milliméter sugárfogó kontrasztanyagot töltünk, mely a hörgők falát röntgenfelvételen kirajzolja, így a vizsgálat során nem belátható kis hörgők kóros eltérései felismerhetők. Ezt követően a kontrasztanyagot leszívjuk. A nem leszívható maradék részben felszívódik, részben köhögéssel a légutakból eltávozik.
- **Hörgőnyálkahártya mintavétel (biopsia)**
Az eszközön keresztül gombostűfejnyi nyálkahártya darabot kimetszünk, melynek mikroszkópos és elektromikroszkópos vizsgálatával a kóros eltérések, betegségek felismerhetők.

A HÖRGŐTÜKRÖZÉS VESZÉLYEI

A vizsgálat során a leggyakoribb kivétel mellett is előfordulhat hörgőnyálkahártya vérzés vagy igen ritkán a hörgőfal sérülése. A vérzés rendszerint spontán, beavatkozás nélkül szűnik, erősebb vérzés esetén azt helyileg kezeljük. A hörgőfal sérülése esetén levegő juthat a mellüregbe (légmell). Enyhe esetben kezelés nélkül felszívódik, jelentősebb mennyiség esetén mellkasi szívókezelést végzünk. Sebészeti ellátást igénylő sérülés előfordulása igen ritka.

Fentebb leírt tájékoztatót megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Gyermekeknél (név, szül. dátum)

- A beavatkozás elvégzéséhez **hozzájárlok.**
- A beavatkozáshoz **nem járlok hozzá**, annak ellenére, hogy elmaradása esetén a lehetséges következményekről felvilágosítást kaptam.
- Az adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem, gyermekem személyes és különleges adatainak kezeléséhez hozzájárulásomat adom.

Dátum:.....

.....
orvos aláírása

.....
szülő (gyám) aláírása